

ApaL I

G T G C A C
C A C G T G

Code No. 1237A

包装量: 600 U
浓度: 10 U/ μ l

附带试剂: 10X L Buffer 1 ml
10X Loading Buffer 1 ml

● 酶贮存液:

10 mM	Tris-HCl, pH7.5
100 mM	KCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.01%	BSA
0.15%	Triton X-100
50%	Glycerol

● 保 存: -20°C

● 起 源: *Acetobacter pasteurianus*

● 一般反应体系:

ApaL I	1 μ l
10X L Buffer	2 μ l
DNA	\leq 1 μ g
灭菌水	up to 20 μ l

● 反应温度: 37°C

● 活性确认:

在50 μ l反应液中, 37°C温度下反应1小时, 将1 μ g的λ DNA完全分解的酶量定义为1个活性单位(U)。

● 质量控制:

请查阅各批次 Certificates of Analysis (CoA)。产品 CoA 请在 Takara Bio Inc.网站中下载:
http://catalog.takara-bio.co.jp/search/doc_index.php。

● 在各种 Universal Buffer 中的相对活性:

Universal Buffer	L	M	H	K	T (+BSA)
相对活性(%)	100	20	<20	<20	120

● Basal Buffer 中盐离子对酶活性的影响:

Salt(mM)	0	20	40	50	60	80	100
NaCl(%)	250	200	120	120	100	50	10
KCl(%)	250	200	120	120	50	40	10

● Basal Buffer 组成:

10 mM	Tris-HCl, pH8.0
7 mM	MgCl ₂
50 mM	NaCl
7 mM	2-mercaptoethanol
0.01%	BSA

● 各种 DNA 的切断数:

	SV	ϕ X	pBR	pUC	pUC	M13	Col
λ	Ad2	40	174	322	19	119	mp18 E1
4	7	0	1	3	3	3	0 1

● 甲基化的影响:

当序列为 GTGCACG 时, 受 CG methylase 的影响。

● Universal Buffer 组成 (-20°C保存) :

1.10XL	100 mM Tris-HCl, pH7.5	4.10XK	200 mM Tris-HCl, pH8.5
100 mM	MgCl ₂	100 mM	MgCl ₂
10 mM	Dithiothreitol	10 mM	Dithiothreitol
2.10XM	100 mM Tris-HCl, pH7.5	1,000 mM	KCl
100 mM	MgCl ₂	5.10XT	330 mM Tris-Ac, pH7.9
10 mM	Dithiothreitol	(BSA 100 mM Mg-Ac - free)	5 mM Dithiothreitol
500 mM	NaCl	660 mM K-Ac	
3.10XH	500 mM Tris-HCl, pH7.5	6. 0.1% BSA	
100 mM	MgCl ₂	7. 0.1% Triton X-100	
10 mM	Dithiothreitol		
	1,000 mM NaCl		

● 10X Loading Buffer 组成 (开封后室温保存) :

0.9%	SDS
50%	Glycerol
0.05%	Bromophenol Blue

使用时添加反应液量的1/10, 即可停止反应, 进行电泳。在室温下保存时, SDS 有时也会出现沉淀, 此时请在温水浴中溶解后使用。

注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品, 或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权, 请联络我们, 或访问我们网站 www.takara-bio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文档由宝日生物医药技术(北京)有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v201810Da