

Perfect GelBlue Nucleic Acid Gel Stain

(10,000X in water)

Code No. TCH016

包装量: 500 μ l

浓 度: 10,000X in water

制品说明:

Perfect GelBlue 是一种新型核酸染料。灵敏度高，工作浓度下没有诱变性，相对溴化乙锭等不安全染料，是灵敏、安全、稳定的核酸染料，可完全替代溴化乙锭。适用于琼脂糖凝胶或丙烯酰胺凝胶电泳。可用于 dsDNA、ssDNA 及 RNA 染色。它可以被 488 nm 激光激发，可用蓝光切胶仪或蓝光扫描仪直接观察。

Perfect GelBlue 分子结构特殊，具备更有优势的特点：

1. 不会受到特殊 DNA 结构的影响，不会产生条带弥散的现象。
2. 具有良好的热稳定性，可以直接添加到热的琼脂糖溶液中而不需要等待溶液冷却，也可将其与含有琼脂糖粉末的电泳缓冲溶液混合，加热进行制备。
3. 兼容性好，可使用蓝光或紫外光激发，兼容蓝光检测仪器以及紫外凝胶成像系统，优选蓝光切胶仪和蓝光扫描仪，信号更强，可以减少有害紫外光暴露的风险。

保 存：室温保存

使用方法：

1. 胶染法

使用 1X 工作液（每 50 ml 琼脂糖凝胶，加入 5 μ l 10,000X Perfect GelBlue），并充分混匀。

注：Perfect GelBlue 具有良好的热稳定性，可直接加入热的琼脂糖凝胶中。也可以在凝胶加热前，事先加入 Perfect GelBlue。

2. 泡染法

- 1) 按常规方法制备不含染料的凝胶进行电泳；
- 2) 再制备 3X Perfect GelBlue 工作染色液。即将 Perfect GelBlue 稀释约 3300 倍，到 0.1 M NaCl 水溶液中。（例如：配制 50 ml 泡染液，需要将 15 μ L 10,000 X Perfect GelBlue 和 5 mL 1 M NaCl 加到 45 mL H₂O 中。）
- 3) 将凝胶放入适当容器，加入 3X 染色液，没过凝胶，振荡染色 30 min~1 h。丙烯酰胺凝胶需要适当延长染色时间。不需要脱色。
随着凝胶厚度和浓度的增加，也需要适当延长染色时间。
- 4) 蓝光或紫外成像。

使用注意：

1. 胶染法制备的凝胶为浅橘红色，电泳后会出现上半部分胶颜色深，下半部分胶颜色浅的情况，属于正常现象。
2. Perfect GelBlue 被蓝光激发的效果优于紫外，主要适用于蓝光切胶仪和蓝光扫描仪，如果用紫外激发，条带相对偏弱。
3. 泡染的染色液可重复使用 3 次左右。建议将需要继续使用的染色溶液避光保存。
4. 工作浓度（3X 以下）无诱变性。当接触原液或高浓稀释液时，请穿实验服并戴一次性手套操作。
5. 原液或泡染工作液废弃排放前，请稀释到 1X 工作浓度以下。

注意

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经 Takara Bio Inc. 书面许可授权或批准，不得制造、许诺销售、销售、进口 Takara 产品，或者使用 Takara 产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权，请联络我们，或访问我们网站 www.takarabio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术（北京）有限公司翻译制作，最新版本文件请参考 Takara Bio（中国）网站。为正确使用 Takara 产品，您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v202407Da